

正 誤 表

『明日から使える！精神科薬物療法の臨床 Hack』p15 の表内に誤りがございましたので、下記のように訂正してお詫び申し上げます。

	躁病エピソード	抑うつエピソード	維持療法
誤) アリピプラゾール	推奨・適応あり	推奨・適応外	推奨なし
正) アリピプラゾール	推奨・適応あり	推奨なし	推奨・適応外

正 表 双極症に対する推奨と適応

	躁病エピソード	抑うつエピソード	維持療法
リチウム	推奨・適応あり	推奨・適応外	推奨・適応外
バルプロ酸	推奨・適応あり	推奨・適応外	推奨・適応外
カルバマゼピン	推奨・適応あり	推奨・適応外	推奨・適応外
オランザピン	推奨・適応あり	推奨・適応あり	推奨・適応外
アリピプラゾール	推奨・適応あり	推奨なし	推奨・適応外
クエチアピン	推奨・適応外	推奨・適応 ^{※1}	推奨・適応外
リスペリドン	推奨・適応外	推奨なし	推奨・適応外 ^{※2}
パリペリドン	推奨・適応外	推奨なし	推奨・適応外
アセナピン	推奨・適応外	推奨なし	推奨なし
ルラシドン	推奨なし	推奨・適応あり	推奨・適応外
ラモトリギン	推奨なし	推奨・適応外	推奨・適応あり

※ 1：徐放錠以外は適応外、※ 2：リスペリドン持効性注射薬

(日本うつ病学会気分障害の治療ガイドライン作成委員会：日本うつ病学会治療ガイドライン 1．双極性障害 2020, 2020¹³⁾をもとに著者作成)